

# Anwendung

Verwenden Sie das Carnosine-Pflaster 1 bis 3 Tage pro Woche und versuchen Sie nacheinander diese Punkte. Sie können alle in dieser Broschüre gezeigten Punktplatzierungen auch für ein beliebiges Y-Age-Pflaster benutzen, aber die bevorzugten Stellen für das Carnosine-Pflaster sind rechts abgebildet.

Wenn Sie Y-Age-Produkte kombinieren, verwenden Sie 2 Pflaster Ihrer Wahl an 2 beliebigen Y-Age-Punkten in dieser Broschüre und bringen Sie die Pflaster entweder an der Mittellinie oder der rechten Körperseite an.

Die Pflaster stets morgens auf die gesäuberte, trockene Haut aufbringen. Die Pflaster können bis zu 12 Stunden lang getragen werden. Danach bitte wegwerfen. Achten Sie darauf, dass der Körper bei der Verwendung des Produkts stets ausreichend mit Wasser versorgt ist.

## Nutzen von Carnosin

- **Verbessert den allgemeinen Gesundheitszustand**
- **Verbessert die bioelektrischen Eigenschaften von Organen**
- **Trägt zur Minderung von feinen Linien und Falten bei\***
- **Klinisch nachgewiesene Steigerung der Ausdauer um 125%\*\***

\*Bei regelmäßiger und gemeinsamer Verwendung mit Y-Age Aeon und Y-Age Glutathione.

\*\*Nach 3 Anwendungswochen.

**Warnhinweise:** Nehmen Sie das Pflaster bei Beschwerden oder Hautreizungen sofort ab. Ein von der Haut abgenommenes Pflaster darf nicht wiederverwendet werden. Nur zur äußeren Anwendung. Nicht zum Verzehr bestimmt. Nicht auf Wunden oder beschädigter Haut anbringen. Wenn Sie an einer Krankheit leiden oder wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich an einen Arzt. Die Pflaster dürfen nicht von schwangeren oder stillenden Frauen verwendet werden.

**ANLAGE 1**

Am Brustbein (das Brustbein befindet sich direkt in der Mitte der Brust).

**ANLAGE 2**

An der Basis des Nackens, wo der Rückenwirbel C7 vorsteht, wenn Sie das Kinn auf die Brust legen.

**ANLAGE 3**

Auf dem RECHTEN Handrücken im Verbindungsgewebe auf dem Knochen des Zeigefingers.

**ANLAGE 4**

An der Basis der Wirbelsäule, direkt oberhalb des Steißbeins.

**ANLAGE 5**

Auf der Falte des RECHTEN Handgelenks, rund einen Finger breit von der Mitte entfernt in Richtung kleiner Finger.